




يعقد صندوق الحقائق هذا المقارنة بين البالغين تحت سن 60 عامًا بدون تطعيم ضدَّ مرض كوفيد-19 (الجانب الأيسر) والبالغين المُطعَّمين (الجانب الأيمن). تُشير التقديرات إلى أنَّ 240 من كلِّ ألف شخص من غير المُطعَّمين يمرضون. يمكن مقارنة ذلك بخطر إصابتكم بالمرض لدى مخالطتكم لشخصٍ مُصاب بالعدوى.

من كلِّ ألف شخص بالغ غير مُطعَّم

من كلِّ ألف شخص بالغ مُطعَّم

فوائد التطعيم

أضرار التطعيم



240

6  
إلى  
31

?

0

0

0

كم عدد من يُصابون بمرض كوفيد-19؟

كم عدد من تتحتم معالجتهم في المستشفى من بينهم  
- بحكم السن أو من جراء مرضٍ سابق - نظرًا لاتخاذ  
مرضهم لشكلٍ حرجٍ؟

كم عدد من يُعانون بشكلٍ دائمٍ من العواقب المترتبة على  
إصابتهم بمرض كوفيد-19؟

لا زالت الأرقام غير مؤكدة. هناك مؤشرات واضحة على الإصابة الدائمة بضيق التنفس واضطرابات في الذاكرة بسبب مرض كوفيد-19 („لونغ كوفيد“ أو كوفيد-19 طويل الأمد).

كم عدد الأشخاص غير القادرين على مزاوله أنشطة  
حياتهم اليومية في الأيام اللاحقة المنفردة بسبب تلقيهم  
لجرعة تطعيم (لكونهم يُعانون من الإرهاق المؤقت، أو  
الحُمى، أو الآلام، أو الارتجاف)؟

كم عدد الأشخاص الذين يُعانون نتيجةً لجرعة لقاح في  
غضون شهرٍ من ضررٍ جسيمي (مثل التفاعلات التحسسية  
المفرطة)؟

كم عدد الأشخاص الذين يُصيبهم ضررٌ دائمٍ بسبب  
التطعيم؟

لا يوجد حاليًا أيُّ دليلٍ على حدوث الأضرار الدائمة.

10


0  
إلى  
1

?

82

~ 0

?



ملحوظة: في العادة، تهدأ التفاعلات النموذجية للتطعيم، والتي قد تحدث في الذراع أو في الجسم كله، بعد يوم إلى يومين. تجري في الوقت الحالي دراسة ظهور التفاعلات النادرة للتطعيم، كما التفاعلات التحسسية المفرطة، وكذلك أوجه الصلة المحتملة فيما بين التطعيم والتفاعلات غير النموذجية (على سبيل المثال، الأرق، وتضخم الغدة الليمفاوية، وشلل الوجه المؤقت). كما ولا تزال تُجرى حاليًا البحوث حول مدة الحماية التي يوفرها التطعيم.




يعقد صندوق الحقائق هذا المقارنة بين البالغين بدايةً من سن 60 عامًا بدون تطعيم ضدّ مرض كوفيد-19 (الجانب الأيسر) والبالغين المُطعّمين (الجانب الأيمن). تُشير التقديرات إلى أنّ 240 من كلّ ألف شخص من غير المُطعّمين يمرضون. يمكن مقارنة ذلك بخطر إصابتكم بالمرض لدى مخالطتكم لشخصٍ مُصاب بالعدوى.

من كلّ ألف شخص بالغ غير مُطعّم

من كلّ ألف شخص بالغ مُطعّم

فوائد التطعيم

أضرار التطعيم



240

كم عدد من يُصابون بمرض كوفيد-19؟

36

كم عدد من تتحم معالجتهم في المستشفى من بينهم - بحكم السن أو من جراء مرضٍ سابق - نظرًا لاتخاذ مرضهم لشكلٍ حرجٍ؟

إلى 120

؟

كم عدد من يُعانون بشكلٍ دائمٍ من العواقب المترتبة على إصابتهم بمرض كوفيد-19؟

لا زالت الأرقام غير مؤكدة. هناك مؤشرات واضحة على الإصابة الدائمة بضيق التنفّس واضطرابات في الذاكرة بسبب مرض كوفيد-19 („لونغ كوفيد“ أو كوفيد-19 طويل الأمد).

0

كم عدد الأشخاص غير القادرين على مواصلة أنشطة حياتهم اليومية في الأيام اللاحقة المنفردة بسبب تلقيهم لجرعة تطعيم (لكونهم يُعانون من الإرهاق المؤقت، أو الحمى، أو الآلام، أو الارتجاف)؟

0

كم عدد الأشخاص الذين يُعانون نتيجةً لجرعة لقاح في غضون شهرٍ من ضررٍ جسيمي (مثل التفاعلات التحسسية المفرطة)؟

0

كم عدد الأشخاص الذين يُصيبهم ضررٌ دائمٍ بسبب التطعيم؟

لا يوجد حاليًا أي دليل على حدوث الأضرار الدائمة.

24

1


إلى 5

؟

49

~ 0

؟



ملحوظة: في العادة، تهدأ التفاعلات النموذجية للتطعيم، والتي قد تحدث في الذراع أو في الجسم كله، بعد يوم إلى يومين. تجري في الوقت الحالي دراسة ظهور التفاعلات النادرة للتطعيم، كما التفاعلات التحسسية المفرطة، وكذلك أوجه الصلة المحتملة فيما بين التطعيم والتفاعلات غير النموذجية (على سبيل المثال، الأرق، وتضخم الغدة الليمفاوية، وشلل الوجه المؤقت). كما ولا تزال تُجرى حاليًا البحوث حول مدة الحماية التي يوفرها التطعيم.